

Juhend lennuki meeskonnale

Kui lennukis reisi ajal ilmnevad reisijal kõrgeltpatogeense linnugripi haigusnähud (palavik üle 38°C, köha, nohu, kurguvalu, pea- ja lihasevalu, konjunktiviit jm) ning ta viibis eelneva 7 päeva jooksul linnugripi riskipiirkonnas või oli kontaktis kõrgeltpatogeense linnugripi haigega või haiguskahtlase isikuga, siis:

- võimalusel isoleerida nakkuskahtlane reisija teistest reisijatest ja meeskonnast;
- respiratoorsete sümptomite (köha ja nohu) esinemisel panna nakkuskahtlasele reisijale ette kirurgiline kaitsemask, et vältida viiruste levikut teistele reisijatele. Kui kaitsemaski ei ole või kui haige reisija ei saa seda hingamisraskuste tõttu kasutada, siis tuleb ta varustada hügieeniliste salvrätikute ja prügikotiga kasutatud salvrätikute kogumiseks. Hingamisraskuste esinemisel võiks haigele anda hapniku. Lennukis on olemas väiksed kaasaskantavad hapnikuballoonid koos maskiga. Hapnikusüsteem (mask ja ballonn) tuleb pärast kasutamist desinfitseerida;
- jagada kirurgilised kaitsemaskid lähikontaktsetele (nakkuskahtlasest isikust kuni 2 m kaugusel istuvatele reisijatele) ning teenindavale personalile. Küsida ka haige reisija saateisikute (sugulased, sõbrad) terviseseisundi kohta;
- pesta tihti käsi või kasutada hügieenilisi salvrätte;
- määrata üks meeskonnaliige (salongipersonalist) haige reisija jälgimiseks ja hooldamiseks. Haige reisijaga kontakteerumisel kasutab ta kaitsemaski ja kummikindad. Kohe pärast haige reisijaga kokkupuudet võtab ta käest kasutatud kaitsekindad ja peseb käed seebiga. Kui käed ei ole nähtavalt saastunud, võib kasutada hügieenilisi salvrätte;
- kaitsemaskid ja kummikindad pärast kasutamist panna prügikotti markeeringuga "nakkusohhtlikud jäätmed";
- võimalusel eraldada tualettruum ainult haigele kasutamiseks. Kui sellist võimalust ei ole, siis tuleb pärast haige reisija külastust üldkasutatav tualettruum puhastada pesemis- ja desinfektsioonivahenditega (ukse käepide, prügikast ja veekraani ventiil, lauapind jne);
- nii kiiresti kui võimalik (soovitav vähemalt 20–30 min enne maandumist) teavitab lennuki kapten sihtlennujaama kõrgeltpatogeense linnugripi haiguskahtlasest reisijast lennuki pardal. Tallinnasse saabuva õhusõiduki kapten teavitab Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhti;
- kuigi sihtlennujaama saabumisel kõiki kontaktseid reisijaid küsitletakse ja instrueeritakse, on soovitatav juba lennukis koostada nakkuskahtlasest isikust kolm rida ette- ja tahapoole istuvate reisijate nimekiri koos nende kontaktandmetega;
- pärast reisijate lahkumist tehakse lennuki salongis märgpuhastamine ja pindade desinfitseerimine 1%-lise Na-hüpokloriidiga või muu desinfektsiooni vahendiga, mida on lubatud kasutada lennukis.

Koostaja: Tervisekaitseinspektsiooni epidemioloogiaosakond
WHO ja IATA soovitude alusel