

Kahtlase haigusjuhu käsitlemine

- SARS-nakkuse kahtlus tekib haige puhul, kellel esineb: üle 38°C palavik ja lisaks üks järgnevatest sümptomitest:
 - kuiv köha või
 - hingamispuudulikkus;
- ja patsient on olnud eelneva 10 päeva jooksul lähikontaktis tõenäolise SARS-haigega või viibis eelneva 10 päeva jooksul reisil riskipiirkonnas.
- SARS-nakkuse kahtlusega haige eraldatakse teistest haigetest ja paigutatakse isoleerimisruumi.
- Haigele antakse hingamisteid kattev kaitsemask.
- Haigelt kogutakse üksikasjalik kliiniline anamnees, reisianamnees ja andmed kontaktsete kohta (kas kontaktsetel on viimase 10 päeva jooksul esinenud SARS-nakkuse haigusnähte).
- Tehakse kopsude röntgenpilt ja kliiniline vereanalüüs.
- Juhul, kui kopsude röntgenpilt on patoloogiat, kuid esinevad muud respiratoorse viirusnakkuse tunnused
 - määratakse haige kodusele ravirežiimile kuni 10 päevaks,
 - jäetakse arstliku järelevalve alla kuni 10 päevaks,
 - antakse isikliku hügieeni soovitused,
 - soovitakse koheselt kutsuda arst juhul, kui terviseseisund halveneb ja ilmub hingamispuudulikus.
- Juhul, kui kopsude röntgenpildis on ühe- või mõlemapoolsed infiltraadid interstitsiaalse põletiku nähtudega, on tegemist tõenäolise haigusjuhuga.

Koostaja Tervisekaitseinspeksioon
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovituste alusel