

## **Ägedate lõtvade halvatustega poliomüeliidikahtlaselt haigelt uurimismaterjali võtmise ja uuringule saatmise juhend**

- 1.** Poliomüeliidikahtlaseks loetakse ägeda lõdva halvatusega haigusjuhtu (eelkõige Guillain-Barré sündroomi) juhul, kui see ei ole põhjustatud mingi teadaoleva teguri (trauma, kasvaja ja muu) poolt. Eriti tähelepanelikult tuleb suhtuda kuni 15-aastastel lastel esinevatesse ägedatesse lõtvadesse halvatustesse.
- 2.** Poliomüeliidikahtlasest haigest teatab arst kohe Terviseameti piirkondlikule esindusele. Viimane edastab saadud teabe Terviseameti Kesklabori nakkushaiguste laborile (Kotka 2, 11315, Tallinn, tel. 6943635).
- 3.** Raviarst korraldab poliomüeliidikahtlaselt haigelt kahe väljaheiteproovi võtmise: 8-10 g 24-48 tunnise vahega. Väljaheite proovid peavad olema võetud 14 päeva jooksul alates lõtvade halvatuste ilmumisest. Proove säilitatakse +4 °C juures.
- 4.** Raviarst saabab väljaheiteproovid võimalikult kiiresti (24 tunni jooksul) koos saatekirjaga (lisa 1) külmapatareidega varustatud termoskotis (temperatuuril +4 °C) Terviseameti piirkondlikule esindusele või otse Terviseameti nakkushaiguste laborisse (Kotka 2, 11315, Tallinn, tel. 6943635).
- 5.** Epidemioloogilise olukorra ja poliomüeliidi vastase vaksineerimise anamneesi väljaselgitamiseks korraldab Terviseameti piirkondlik esindus haiguskoldes epidemioloogilise uuringu ja kõigilt alla 15 aastastelt pereliikmetelt/lähikontaktsetelt väljaheiteproovide võtmise ja nende saatmise nakkushaiguste laborisse. Haiguskolde epidemioloogilise uuringu tulemused saadetakse Terviseametile.
- 6.** Raviarst edastab haigusjuhu uuringuvormi I osa (lisa 2) nädala jooksul ja II osa (lisa 3) 60 päeva möödumisel Terviseameti nakkushaiguste laborisse (Kotka 2, 11315 Tallinn).