

## Genitaal-klamüdiaas

Genitaal-klamüdiaas on sageli esinev sugulisel teel leviv nakkushaigus, mis võib esineda samaaegselt gonorröaga.

### ***Haigusetekiitaja***

Haigusetekiitajaks on *Chlamydia trachomatis*'e immuunotüübid D kuni K.

### ***Nakkuseallikas***

Nakkuseallikaks on haigust põdev inimene.

### ***Haigusetekiitajate levimine***

Haigusetekiitajad levivad sugulise kokkupuute teel. Korduvmakatumist esineb sageli.

### ***Inkubatsiooniperiood***

Lõimetuseperioodi pikkuseks on 7-14 päeva, vahel kauem.

### ***Haigusenähud***

Meestel tekib kusejuha põletik koos sügelemise ja valuliku urineerimisega, mida on raske eristada gonorröast. Ravimata juhtudel on tüsistuseks munandimanuste põletik, Reiteri sündroom või steriilsus ning meestega seksivatel meestel – pärasoole põletik. Kuni 25%-l nakatunud meestest võib genitaal-klamüdiaas kulgeda haigusenähudeta. Naistel kujuneb sageli emakakaela põletik ning haigusenähud sarnanevad gonorröa nähtudega. Ravimata juhtudel on sagedaseks tüsistuseks salpingiit ehk munajuhapõletik koos sellele järgneva steriilsusega lisaks võib esineda emakaväline rasedus, krooniline vaagnapiirkonna valu, bartoliniit, urineerimise häired ja pärasoolepõletik. Kuni 70%-l nakatunud naistest võib genitaal-klamüdiaas kulgeda haigusnähudeta.