

Taenia solium teniaas ehk nookpaelusstõbi

Tekitaja. Teniaas on zooantroponoos. Nookpaelusstõbe põhjustab nookpaeluss *Taenia solium*. Peremeesorganismiks on inimene ja vaheperemeheks on kodu- või mets siga, vahel ka inimene. Kui inimene on vaheperemeheks, siis on tegemist tsüstitserkoosiga ja kui inimene on põhiperemeheks, siis on haiguse nimetuseks teniaas. Suguküpsed nookpaelussid parasiteerivad peensooles.

Levik. Nookpaeluss on levinud ülemaailmselt maades, kus toitutakse toorest või väheküpsetatud sealihast. Eestis tuvastati aastail 2000- 2001 kaks haigusjuhtu.

Nakkusallikas on siga.

Nakatumine. Inimene nakatub väheküpsetatud sealiha söömisel.

Lõimetusperiood – *Taenia soliumi* munad ilmuvad roojasse 8-12 nädalat pärast nakatumist.

Haige nakkusohtlikkus. Haige inimene võib olla suhtlemisel nakkusohtlik. Täiskasvanud nookpaeluss võib ravimata inimese sooles elada aastaid (kuni 30 aastat). Haige inimene on nakkusallikana ohtlik sigadele, kes nakatuvad inimese roojaga saastunud söödast.

Immuunsust pärast nookpaelusstõve põdemist ei kujune.