

Trihhomoniaas

Trihhomoniaas on ulatuslikult esinev sugulisel teel leviv nakkushaigus, millesse nakatuvad peamiselt suguliselt aktiivsed täiskasvanud. Trihhomoniaas esineb sageli samaaegselt gonorröa ja streptokokinakkusega.

Haigusetekitaja

Haigusetekitaja on protozoa *Trichomonas vaginalis*.

Nakkuseallikas

Nakkuseallikaks on nakatunud inimene. Sageli on nakkusallikaks asümptomaatiline haigusetekitaja-kandja.

Haigusetekitajate levimine

Haigusetekitajad levivad sugulise kokkupuute teel.

Inkubatsiooniperiood

Lõimetuseperioodi pikkuseks on 4-20 päeva (keskmiselt 7 päeva).

Haigusenähud

Trihhomoniaasi nakatuvad sagedamini naised. Pärast lõimetuseperioodi lõppemist tekivad naistel valgevoolus, suguelundite sügelemine-kipitus, sage urineerimine ja valu allkõhus. Naistel on trihhomoniaasi haigusevormideks vulviit, kolpiit, tservitsiit, vestibuliit, bartoliniit, endometriit, uretriit või tsüstiit.

Meestel kulgeb trihhomoniaas sageli haigusenähtudeta. Haigusenähtudega juhtudel on haigusevormideks uretriit, seemnepõiekeste, munandimanuste või eesnäärme põletik.