

2007. aasta nakkushaiguste esinemine:

Tabel 1. Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus

Nakkushaigused	2007. a		2006. a	
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta
Kõhutüüfus/paratüüfused	2	0,1	1	0,07
Meningokokknakkus	11	0,8	11	0,8
<i>Haemophilus influenzae</i> nakkus	23	1,7	20	1,4
Leegionärihaigus	3	0,2	4	0,3
Neerusündroomiga hemorraagiline palavik	7	0,5	15	1,1
Leptospiroos	2	0,1	6	0,4
Toksoplasmoos	1	0,07	3	0,2
Leetrid	1	0,07	27	2,0
Malaaria (sissetoodud)	5	0,4	6	0,4
Listerioos	3	0,2	1	0,07
Tulareemia	2	0,1	0	
Tuberkuloos	400	29,8	330	24,5
HIV-nakkus	633	47,2	668	49,7
HIV- tõbi	57	4,2	34	2,5

Soolenakkused:

Võrreldes 2006. aastaga suurenes 2007. aastal haigestumine soolenakkustesse 24% võrra (2007. a – 3972 juhtu, 2006. a – 3200 juhtu), eriti märgatavalt suurenes haigestumine noroviirusnakkusesse – 2,9 korda (2007. a – 496 haigusjuhtu, 2006. a – 168 haigusjuhtu), shigelloosi 2,2 korda (2007. a – 114 haigusjuhtu, 2006. a – 53 haigusjuhtu), täpsustamata soolenakkustesse – 82,8% võrra (2007. a – 1515 juhtu, 2006. a – 829 juhtu), jersinioosi 81% võrra (2007. a – 76 juhtu, 2006. a – 42 juhtu) ja muudesse täpsustatud soolenakkustesse 27,4% võrra (2007. a – 195 juhtu, 2006. a – 153 juhtu).

Vähenes haigestumine *E.coli* soolenakkusesse – 29,2% võrra, rotaviirusenteriiti – 25% võrra, kampülobakterenteriiti – 8,1% võrra ja salmonelloosi – 5,5% võrra.

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused:

2,7 korda suurenes haigestumine läkaköhasse (2007. a – 409 haigusjuhtu, 2006. a – 153 haigusjuhtu), 2 korda punetistesse (2007. a – 10 haigusjuhtu, 2006. a – 5 haigusjuhtu), 2 korda sarlakitesse (2007. a – 346 ja 2006. a – 174 haigusjuhtu), esmasesse tuberkuloosi 21,2% võrra (2007. a – 400, 2006. a – 330 haigusjuhtu), tuulerõugetesse haigestumine kasvas 16,7% võrra (2007. a – 7795 haigusjuhtu, 2006. a – 6679 haigusjuhtu) ja *Haemophilus influenzae* nakkusesse 15,0% võrra (2007. a – 23, 2006. a – 20 haigusjuhtu). Vähenes haigestumine mononukleosi 8,1% võrra.

2007. aastal registreeriti üks leetrite haigusjuht (2006. aastal 27 haigusjuhtu). Haigestumine mumpsi, meningokokknakkusesse ja pneumokokknakkusesse on jäänud 2006. aasta tasemele.

Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused:

Haigestumine ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse on 2006. a tasemel (2007. a – 248855 ehk 18543,6 100 000 el. kohta, 2006 .a – 247192 ehk 18398,5 100 000 el. kohta). Haigestumine grippi on 4,0 korda kõrgem võrreldes 2006.aastaga (2007. a – 2832 haigusjuhtu, 2006. a – 693 haigusjuhtu).

Muudest nakkushaigustest vähenes 3 korda haigestumine leptospiroosi (2007. aastal registreeriti 2 haigusjuhtu, 2006. aastal – 6 haigusjuhtu) ja 2,1 korda haigestumine neerusündroomiga hemorraagilisse palavikku (vastavalt 7 ja 15 haigusjuhtu).

Haigestumine viirushepatiitidesse on võrdne 2006. aastaga. Kuid haigestumise analüüs näitab, et 2 korda suurenes haigestumine A-viirushepatiiti: 2007. a – 10 juhtu, 2006. a – 5 juhtu ning vähenes 36,8% võrra ägedasse C-viirushepatiiti: vastavalt 36 ja 57 haigusjuhtu. Haigestumine ägedasse B-viirushepatiiti on samal tasemel: vastavalt 44 ja 45 haigusjuhtu. Kasvab krooniliste B- ja C-viirushepatiitide osakaal hepatiitidesse üldhaigestumises: 2007. a – 66% hepatiitide üldarvust, 2006. a – 61% hepatiitide üldarvust.

Puukborrelioosi haigestumine suurenes 2007. aastal 49,6% võrra (2007. a – 721, 2006. a – 482 haigusjuhtu). Puukentsefaliiti haigestumisi oli 18,1% võrra vähem (vastavalt 140 ja 171 haigusjuhtu).

2007. a 11 kuuga registreeriti 5 sissetoodud malaaria haigusjuhtu, 2006. aastal – 6 haigusjuhtu.

Loomahammustuste arv vähenes 12,2% võrra (2007. a – 2588, 2006. a – 2948).

Sugulisel teel levivad nakkushaigused: haigestumine süüfilisse vähenes 39,2% võrra, 2007. aastal registreeriti üks kaasasündinud süüfilis. Haigestumine gonokokknakkusesse vähenes 37,8% võrra, herpesviirusnakkusesse – 9,5% võrra. Haigestumine klamüüdiannakkusesse võrreldes 2006. aastaga märgatavalt ei muutunud.

2007. aastal registreeritud HIV-nakkuse arv vähenes 5,2% võrra (vt tabel 1). Registreeritud HIV-tõve juhtude arv suurenes 67,6% võrra (2007. a – 57 juhtu, 2006. a – 34 juhtu).