


## Kampülobakterenteriit, 2008. aasta 6 kuud

2008. aasta kuue kuuga registreeriti 53 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 3,9). Kõik juhud kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2007. aasta samal perioodil registreeriti 38 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 2,8). Kahel juhul registreeriti seganakkus (üks kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit ja üks kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + noroviirusnakkus) Hospitaliseeriti 17 patsienti (32,1% haigete üldarvust).

### Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2008

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	9	8	7	7	7	15							53

### Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2008.a 6 kuud (100 000 el. kohta)




### Campylobacter. Isoleeritud serotüübid, 2008. a 6 kuud

	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	48	1	4	53
%	90,6	1,9	7,5	

Registreeriti üks kodune kolle kahe haigusjuhuga Raplamaal (*C. jejuni*).  
8 juhul (15,1% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (kõik *C. jejuni*): Egiptuses – kolm, Indias – kaks ning Belgias, Nepalis ja Tais – ca' üks.

Haigetest oli mehi 56,6%, naisi – 43,4%.

### Haigete jagunemine vanusrühmade järgi



On andmed 34 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati maksimaalselt nelja antimikroobse preparaadi suhtes. Kolmel juhul tundlikkus on määratud nelja preparaadi suhtes (5,7%), 29 juhul kolme ja kahel juhul kahe preparaadi suhtes. Kaks tekitajat on resistentsed kolme preparaadi suhtes, 9 – kahe preparaadi suhtes.

#### *Campylobacter*. Antimikroobne tundlikkus, 2008. a 6 kuud

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				0
Ampitsilliin				0
Amoksitsilliin/Klavulaanhape				0
Erütromütsiin	29		4	33
Tetratsükliin	17		9	26
Nalidiksiinhape	7		3	10
Tsiprofloksatsiin	20	1	13	34