


Kampülobakterenteriit, 2008. aasta 3 kuud

2008. aasta kolme kuuga registreeriti 24 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,8). Kõik juhud kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2007. aasta samal perioodil registreeriti 15 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,1). Ühel juhul registreeriti seganakkus (kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + noroviirus)
Hospitaliseeriti kümme patsienti (41,7% haigete üldarvust).

2008.a kuude kaupa registreeritud kampülobakterenteriidid

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	9	8	7										24

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2008.a 3 kuud (100 000 el. kohta)



2008.a 3 kuuga isoleeritud *Campylobacter* serotüübid


	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	22	1	1	24
%	91,6	4,2	4,2	

Rühmaviisilisi haigestumisi ei registreeritud.

4 juhul (16,7% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (kõik *C. Jejuni*): Egiptuses – kaks, Indias – üks ja Tais – üks.

Haigetest oli mehi 58,3%, naisi – 41,7%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi



On andmed 14 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati maksimaalselt nelja antimikroobse preparaadi suhtes. Ühel juhul tundlikkus on määratud nelja preparaadi suhtes (4,2%), 12 juhul kolme ja ühel juhul kahe preparaadi suhtes.

Üks tekitaja on resistentne kolme preparaadi suhtes, kaks – kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				0
Ampitsilliin				0
Amoksitsilliin/Klavulaanhape				0
Erütromütsiin	13		1	14
Tetratsükliin	7		2	9
Nalidiksiinhape	4		1	5
Tsiprofloksatsiin	9		5	14