


Kampülobakterenteriit, 2009. a 9 kuud

2009. aasta 9 kuuga registreeriti 119 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 8,9). Kõik juhud kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2008. aasta samal perioodil registreeriti 112 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 8,3). Neljal juhul registreeriti seganakkus (kampülobakterenteriit + šigelloos, kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + norwalk-viirusnakkus, kampülobakterenteriit + salmonelloos, kampülobakterenteriit + norwalk-viirusnakkus). Hospitaliseeriti 54 patsienti (45,4% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2009. a 9 kuud

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	6	3	9	6	6	17	22	39	11				119

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2009. a 9 kuud (100 000 el. kohta)




Isoleeritud serotüübid, 2009. a 9 kuud

	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	110	0	9	119
%	92,4	0,0	7,6	

Registreeriti kaks kodust kollet kahe juhuga (mõlemad *C. jejuni*, Tallinnas) 9 juhul (7,6% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Azerbaidzani üks, Bulgaarias kaks, Itaalias üks, Indias kaks, Soomes üks, Türgis kaks). Haigestest oli mehi 61,3%, naisi – 38,7%.

Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2009



Andmed on 108 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati minimaalselt ühe ja maksimaalselt kuue antimikroobse preparaadi suhtes. Ühel juhul on tundlikkus määratud kuue preparaadi suhtes (2,3%), kahel juhul viie, 85 juhul kolme, 18 juhul kahe ja kahel juhul ühe preparaadi suhtes.

16 tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Tabel 4. *Campylobacter*. Antimikroobne tundlikkus, 2009. a 9 kuud

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin	3			3
Ampitsilliin	4			4
Amoksitsilliin/Klavulaanhape	1			1
Erütromütsiin	107			107
Tetratsükliin	56	1	14	71
Nalidiksiinhape	11		10	21
Tsiprofloksatsiin	49	2	51	102