


Kampülobakterenteriit, 2009. aasta I kvartal

2009. aasta 3 kuuga registreeriti 18 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,3). Kõik juhud kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2008. aasta samal perioodil registreeriti 24 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,8). Ühel juhul registreeriti seganakkus (kampülobakterenteriit + šigelloos) Hospitaliseeriti 8 patsienti (44,4% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2009

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	6	3	9										18

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2009. a 3 kuud (100 000 el. kohta)



Isoleeritud *Campylobacter* serotüübid, 2009. a 3 kuud


	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	16	0	2	18
%	88,9	0,0	11,1	

Rühmaviisilisi haigestumisi ei esinenud.

Ühel juhul (5,6% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Indias, *C. jejuni*).

Haigetest oli mehi 55,6%, naisi – 44,4%.

Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2009



On andmed 17 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati minimaalselt ühe ja maksimaalselt kuue antimikroobse preparaadi suhtes. Ühel juhul on tundlikkus määratud kuue preparaadi suhtes (5,6%), 11 juhul kolme, kahel juhul kahe ja ühel juhul ühe preparaadi suhtes.

Neli tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus, 2009

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin	3			3
Ampitsilliin	4			4
Amoksitsilliin/Klavulaanhape	1			1
Erütromütsiin	16			16
Tetratsükliin	7		2	9
Nalidiksiinhape	3		3	6
Tsiprofloksatsiin	9		6	15