

Kampülobakterenteriit, 2010. a I kvartal

2010. aasta 1. kvartalis registreeriti 22 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,6). Kõik juhud on kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2009. aasta 1. kvartalis registreeriti 18 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 1,3).


Ühel juhul registreeriti seganakkus (kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + norwalk-viirusnakkus).

Hospitaliseeriti 15 patsienti (68,2% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2010. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	5	5	12										22

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2010. a I kvartal (100 000 el. kohta)



Isoleeritud serotüübid, 2010. aasta


	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	19	0	3	22
%	86,4	0,0	13,6	

Registreeriti üks kodune kolle kahe juhuga (*C. jejuni*, Ida-Virumaal)

Viiel juhul (22,7% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Indias kaks, Filipiinidel üks, Tais üks, Türgis üks).

Haigetest oli mehi 36,4%, naisi – 63,6%.

Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2010. aasta



Andmed on 19 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati kahe-kolme antimikroobse preparaadi suhtes. 13 juhul määrati tundlikkus kolme preparaadi suhtes (68,4%), 6 juhul kahe preparaadi suhtes.

Viis tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus, 2010. aasta

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				0
Ampitsilliin				0
Amoksitsilliin/Klavulaanhape				0
Erütromütsiin	19			19
Tetratsükliin	8		5	13
Nalidiksiinhape				0
Tsiprofloksatsiin	8		11	19

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2009

