


Kampülobakterenteriit, 2011. a 3 kuud

2011. aasta 3 kuu jooksul registreeriti 25 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 1,9), kõik on kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2010. aasta samal perioodil registreeriti 22 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 1,6). Võrreldes 2010. aastaga suurenes haigestumine 13,6% võrra. Hospitaliseeriti 12 patsienti (48,0% haigete üldarvust).

Haigete arv kuude kaupa, 2011. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	4	7	14										25

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2011. a



Isoleeritud serotüübid, 2011. aasta


Serotüüp	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Juhtude arv	25	0	0	25
%	100,0	0,0	0,0	

Rühmaviisilisi haigestumisi ei esinenud.

Kuuel juhul (24,0% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Austraalias üks, Indias üks, Tais kaks, Türgis üks, Venezuelas üks).

Haigetest oli mehi 60,0%, naisi – 40,0%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2011. aasta



Andmed on 25 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe-kolme antimikroobse preparaadi suhtes. 20 juhul määrati tundlikkus kolme preparaadi suhtes, kolmel juhul kahe preparaadi suhtes ning kahel juhul – ühe preparaadi suhtes. Viis tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2011 (100 000 el. kohta)

