


Kampülobakterenteriit, 2011. a 9 kuud

2011. aasta 9 kuu jooksul registreeriti 147 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 11,0), mis kõik on mikrobioloogiliselt kinnitatud. 2010. aasta samal perioodil registreeriti 165 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 12,3). Võrreldes 2010. aastaga vähenes haigestumine 10,9% võrra. Hospitaliseeriti 92 patsienti (62,6% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2011. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	4	7	14	15	15	26	25	23	18				147

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2011. a




Isoleeritud serotüübid, 2011. aasta

Serotüüp	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter lari</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	138	1	8	147
%	93,9	0,7	5,4	

Avastati kolm rühmaviisilist haigestumist kahe juhuga (Tallinnas, Pärnumaal ja Raplemaal, kõik *C. jejuni*). 12 juhul (8,2% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Austraalias üks, Hiinas üks, Indias kaks, Lätis üks, Saksamaal üks, Tais kaks, Türgis üks, Ukrainas üks, Venemaal üks, Venezuelas üks).

Haigestest oli mehi 60,5%, naisi – 42,0%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2011. a



Andmed on 136 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe-seitsme antimikroobse preparaadi suhtes. Kahel juhul määrati tundlikkus 7 preparaadi suhtes, 35 juhul kuue preparaadi suhtes, ühel juhul viie preparaadi suhtes, 75 juhul kolme, 18 juhul kahe ning viiel juhul – ühe preparaadi suhtes.

Kolm tekitajat olid resistentsed kolme preparaadi suhtes, 36 – kahe preparaadi suhtes.

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2011 (100 000 el. kohta)

