



COVID-19 andmed seisuga 31.10.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–31.10.2022 registreeriti 744 385 haigusjuhtu, sealhulgas 607 230 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 55 966, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 654.

Seisuga 31.10.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 440,9, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 134,4.

43. nädala jooksul lisandus 2645 haigusjuhtu (733 laboratoorselt kinnitatud ja 1912 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 27,7% juhtudest.

Eelmise nädalaga võrreldes vähenes registreeritud haigusjuhtude arv 17,8% võrra, sh kliiniliselt diagnoositud 11,6% võrra ja laboratoorselt kinnitatud juhtude arv 30,5% võrra.


43. nädalal tehti 6969 testi (524 testi 100 000 el. kohta). Testide koguarv vähenes kõikides vanusrühmades 30% võrra, välja arvatud vanusrühmades üle 80a. Selles vanusrühmas püsib testide arv samal tasemel.

Positiivsete testide osakaal ei muutunud (12,9%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on langusrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud lapsed 0-4a. Suuremat langust täheldati vanuses 10-14a ja 65-69a.

Haigestumus vanusrühmades 100 000 el. kohta, 42.–43. nädal 2022



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja (arvutatud hospitaliseeritute põhjal) on üle-eestiliselt 0,83 (95% usaldusvahemikuga 0.71-0.96)¹.

¹ Krista Fischeri andmed

Regionaal- osakond	Kollete arv	42. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	2	27	6	33	7
LõRO	3	74	13	87	10
KOKKU	5	101	19	120	17

Regionaal- osakond	Kollete arv	43. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	2	12	1	13	13	↑
IRO	2	12	3	15	14	↑
LäRO	4	34	9	43	15	↑
LõRO	4	81	14	95	10	↑
KOKKU	12	139	27	166	52	

Sekvenerimine

Sekvenerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglastest moodustavad BF.7 ja BQ.1. kokku ca 16%. Seni ei ole selget infot nende tüvede omaduste kohta. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

Reoveeseire

43. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus mõnevõrra vähenenud ja on ca 30% ulatuses punasel ohutasemel. Ca 58% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel.

Kõige kõrgemad viiruseosakeste sisalduse näitajad on Narva, Jõhvi-Ahtme ja Põlva piirkonnas.

Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu (sentinel-seire) alusel arvatud etioloogiline struktuur ei ole muutunud. Peamiseks haigestumise põhjustajaks on endiselt rinoviirused.

Suremus


43. nädalal suri 9 inimest, keskmine vanus 82,6 a, neist 4 vaktsineerimata, 2 vaktsineerimiskuur pooleli ja 3 vaktsineeritud (sh üks ainult põhikuuriga).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Kahel inimesel oli peamine surmapõhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on langenud võrreldes 42. nädalaga – 1,29 (oli 1,43).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 47,7%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 31.10.2022 surmaga lõppenud 2 747 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,9% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,8 a); mehi oli 1 348 (49,1 %) ja naisi 1 399 (50,9%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,2% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.



Vaktsineerimine


43. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 215, pooleli oleva kuuriga isikuid 22 ning lõpetatud kuuriga isikuid 496.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



43. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaksineerimata isikuid 27, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 37. Tegemist on 43. nädala jook-sul sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituteaga.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Haigestumuse intensiivsus püsib madalal tasemel, gripiviiruse püsivat levikut ei ole veel täheldatud. Registreeritakse üksikud juhud, kuid gripiviirustega seotud haigestumiste arv vaikselt suureneb.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise suurenemine.

HIV-nakkus

31.10.2022 seisuga tuvastati 213 uut HIV-nakkust, sh 108 (ehk 50,7%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

31.10.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimase kuu jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.