


Kampülobakterenteriit Eestis, 2019. a 3 kuud

2019. aasta kolme kuu jooksul registreeriti 50 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 3,8). Kõik haigusjuhud on kinnitatud laboratoorselt, neist 19 (38,0%) antigeeni määramisega. 2018. aasta samal ajavahemikul registreeriti 44 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 3,3). Võrreldes 2018. aastaga suurenes haigestumine 13,6% võrra. Hospitaliseeriti 26 patsienti (52,0% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriiti haigestumine maakonniti, 2019. a 3 kuud (100 000 el. kohta)



Campylobacter. Isoleeritud serotüübid, 2019. a 3 kuud

Serotüüp	<i>C. jejuni</i>	<i>C. coli</i>	<i>C. lari</i>	<i>C. spp</i>	Kokku
Haigete arv	22	7	1	20	50
%	44,0	14,0	2,0	40,0	


Haigetest oli mehi 56,0% ja naisi 44,0%. Lapsed vanuses 0-14 a moodustavad 54,0% haigetest, 20-49-aastased isikud – 26,0% haigetest.

Rühmaviisilisi haigestumisi ei esinenud.

Nakatumisi väljaspool Eestit ei olnud.

Seost toiduga võib oletada ühel juhul (kanaliha).

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2018. a 3 kuud



29 juhul uuriti *Campylobacter* kultuure Terviseameti laboris (58,0% registreeritud juhtudest). On olemas referentfunktsiooni raames uuritud 51 kultuuri tundlikkuse määramise tulemused. Edastatud andmetes oli 2 multiresistentset *C. coli* (kolme preparaadi suhtes, seost reisimisega ei ole või ei ole teada).

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus, 2019. a 3 kuud

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Erütromütsiin	49		2	51
Gentamütsiin	50		1	51
Tetratsükliin	10		41	51
Tsiprofloksatsiin	3		48	51

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2019. a 3 kuud (100 000 el. kohta)

