

# Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaksineerimisskeemid

## 1. Pneumokokkvaktsiinide kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Soovitav vaksineerimisskeem
6 nädala – 6 kuu vanused riskirühma lapsed	3 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 4-nädalaste intervallidega, 4. doos sama vaktsiini 11-15 kuu vanuses
7 – 11 kuu vanused riskirühma lapsed	2 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 4-nädalaste intervallidega, 3. doos sama vaktsiini 12-15 kuu vanuses (vähemalt 8 nädalat pärast 3. doosi)
12 – 23 kuu vanused riskirühma lapsed	2 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 8-nädalase intervalliga
24 kuu kuni 5 aasta vanused riskirühma lapsed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 doos PVC 20</li> </ul> või 1 doos PCV15, PCV13 või PCV10 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga 1 doos PPSV23
6 aasta kuni 64-aasta vanused riskirühma isikud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 doos PCV20</li> </ul> või 1 doos PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPSV23
65+ täiskasvanud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 doos PCV20</li> </ul> või <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 doos PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 1-aastase intervalliga PPSV23</li> </ul>
65+ riskirühma täiskasvanud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCV20 1 doos</li> </ul> või PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPSV23 ning 5-aastase intervalliga PPSV23

## 2. Meningokokkvaktsiinide MenACWY-TT (Nimenrix) ja MenACWY-CRM<sub>197</sub> (Menveo - Ei turustata Eestis) kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Vaktsiin	Soovitav vaksineerimisskeem
< 12 kuud (lubatud alates 6 nädala vanusest)	Nimenrix	2 doosi (8 nädalase intervalliga). Revaksineerimine: 12 kuu vanuses või hiljem.
>12 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix	1 doos

>24 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix Menveo	1 doos
Täiskasvanud <55	Nimenrix Menveo	1 doos
>56	Nimenrix	Andmed puudulikud
Revaktsineerimine	Nimenrix Menveo	Ametlik soovitus puudub. Vajadusel võib revaktsineerida.

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimisskeem
– 25 aastat	doosi (vaktsineeritakse vähemalt 1-kuulise intervalliga). doos 4 kuud pärast 2. doosi.
– 65 aastat	Andmed piiratud

### **Meningokokkvaktsiinide MenB (Bexsero/Trumenba) kasutamine riskirühmadel MenB (Bexsero)**

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimisskeem
8 nädalat -5 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine: 12-15 kuu vanuses või vähemalt 6 kuud peale esmasvaktsineerimist
6 kuud-11 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine teisel eluaastal vähemalt 2 kuud peale esmasvaktsineerimist
12-23 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine 1 doosiga vähemalt 12-23 kuulise intervalliga peale esmasvaktsineerimist

2 aastat – 50 aastat	2 doosi vähemalt 4-nädalase intervalliga Revaktsineerimist tuleks kaaluda. Ametlikud soovitused puuduvad
>50 aasta vanused	Andmed kasutamise kohta puuduvad

VÕIMALIK OSALINE ALTERNATIIV:

**MenB (Trumenba)**

65 ja vanemad	Andmed puuduvad
Revaktsineerimine	Suurema invasiivse meningokokilise haiguse riskiga patsientidel võib kaaluda.

**NB!** Bexsero ja Trumenba korral kasutada ainult ühte vaktsiini.