

Kampülobakterenteriit, 2007 aasta 9 kuud

2007. aastal registreeriti 9 kuuga 85 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 6,3). 84 juhtu on kinnitatud mikrobioloogiliselt ja ühel juhul pandi diagnoos epidemioloogilise seose alusel. 2006. aasta samal perioodil registreeriti 90 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 6,7).

Viiel juhul registreeriti seganakkus:

kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit – kolm juhtu;

kampülobakterenteriit + salmonelloos – üks juht;


kampülobakterenteriit + šigelloos – üks juht.

Hospitaliseeriti 44 patsienti (51,8% haigete üldarvust).

2007. a kuude kaupa registreeritud kampülobakterenteriidid

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Kokku
Haigete arv	10	4	1	4	8	11	13	20	14	85

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2007. a 9 kuud (100 000 el. kohta)



2007. a 9 kuuga isoleeritud campylobakterite serotüübid

Piirkond	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	67	4	14	85
%	78,8	4,7	16,5	

Rühmaviisilisi haigestumisi ei registreeritud. Avastati üks kodune kolle kahe haigega (oletatav nakatumiskoht välismaal, Peruu).

12 juhul (14,1% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega:

Venemaal – viis *C. jejuni*,


Indias – kaks *C. jejuni* ja kaks *C. sp*,

Peruus – üks *C. jejuni* ja üks kliiniliselt diagnoositud haigusjuht,

Tšehhis – üks *C. coli*.

Haigetest oli mehi 57,6%, naisi – 42,4%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi



Andmeid on 27 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati maksimaalselt nelja antimikroobse preparaadi suhtes. 17 juhul on tundlikkus määratud nelja preparaadi suhtes (62,9%), 8 juhul kolme ja kahel juhul kahe preparaadi suhtes. Kaks tekitajat on resistentsed kolme preparaadi ja üheksa kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				
Ampitsilliin				
Amoksitsilliin/ Klavulaanhape				
Erütromütsiin	26		1	27
Tetratsükliin	14		3	17
Nalidiksiinhape	14		11	25
Tsiprofloksatsiin	15		12	27

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2006

