

## Kampülobakterenteriit, 2007. aasta

2007. aastal registreeriti 114 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 8,5). 113 juhtu kinnitatud mikrobioloogiliselt ja ühel juhul diagnoos pandud epidemioloogilise seose alusel. 2006. aastal registreeriti 124 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 9,2).

Seitsmel juhul registreeriti seganakkus:

kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit – kolm juhtu;

kampülobakterenteriit + salmonelloos – kaks juhtu;

kampülobakterenteriit + šigelloos – üks juht

kampülobakterenteriit + noroviirus – üks juht.

Hospitaliseeriti 60 patsienti (52,6% haigete üldarvust).


### Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2007

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	10	4	1	4	8	11	13	20	14	12	7	10	114

### Campylobacter. Isoleeritud serotüübid, 2007.a

Piirkond	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	94	4	16	114
%	82,5	3,5	14,0	

### Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2007 (100 000 el. kohta)



Rühmaviisilisi haigestumisi ei registreeritud. Avastati üks kodune kolle kahe haigega (oletatav nakatumiskoht välismaal, Peruus).

14 juhul (13,3% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega:

Venemaal – viis *C. jejuni*,


Indias – kaks *C. jejuni* ja kaks *C. sp*,

Peruus – üks *C. jejuni* ja üks kliiniliselt diagnoositud haigusjuht,

Egiptuses – kaks *C. Jejuni*,

Tšehhis – üks *C. coli*.

## Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2007



On andmed 46 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati maksimaalselt nelja antimikroobse preparaadi suhtes. 29 juhul tundlikkus on määratud nelja preparaadi suhtes (63,0%), 15 juhul kolme ja kahel juhul kahe preparaadi suhtes. Viis tekitajat on resistentsed kolme preparaadi suhtes, 17 – kahe preparaadi suhtes.

*Campylobacter*. Antimikroobne tundlikkus, 2007.a

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				
Ampitsilliin				
Amoksitsilliin/ Klavulaanhape				
Erütromütsiin	43		3	46
Tetratsükliin	25		7	32
Nalidiksiinhape	20		21	41
Tsiprofloksatsiin	23		23	46

## Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2007

