

Kampülobakterenteriit, 2010. aasta

2010. aastal registreeriti 197 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 14,7). 196 juhtu on kinnitatud mikrobioloogiliselt, ühel juhul pandi diagnoos kliinilise pildi ja epidemioloogilise seose alusel. 2009. aastal registreeriti 170 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 12,7). Võrreldes 2009. aastaga, suurenes haigestumine 15,9% võrra.


13 juhul registreeriti seganakkus (kuuel juhul kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit, ühel juhul kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + norwalk-viirusnakkus, ühel juhul kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + adenoviirusenteriit, kahel juhul kampülobakterenteriit + norwalk-viirusnakkus, ühel juhul kampülobakterenteriit + shigelloos, ühel juhul kampülobakterenteriit + *E. coli* soolenakkus ja ühel juhul kampülobakterenteriit + salmonelloos).

Hospitaliseeriti 111 patsienti (56,3% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2010. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	5	5	12	20	21	26	39	20	17	13	8	11	197

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2010. aasta



Campylobacter. Isoleeritud serotüübid, 2010. aasta


	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	183	0	14	197
%	92,9	0,0	7,0	

Registreeriti üks kodune kolle kolme juhuga (Narvas, *C. jejuni*) ning kuus kodust kollet kahe juhuga (*C. jejuni* - üks Ida-Virumaal, üks Tallinnas, kolm Narvas ning üks *C. spp* Tallinnas).

19 juhul (9,6% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Egiptuses kolm, Filipiinidel üks, Indias kolm, Indoneesias üks, Lätis üks, Marokos üks, Saksamaal üks, Tais kaks, Türgis kolm, Ukrainas üks, Venemaal kaks).

Haigetest oli mehi 50,8%, naisi – 49,2%.

Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2010. aasta



Andmed on 187 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati kahe-kolme antimikroobse preparaadi suhtes. Ühel juhul määrati tundlikkus nelja preparaadi suhtes, 156 juhul kolme preparaadi suhtes, 30 juhul kahe preparaadi suhtes.

Üks tekitaja oli resistentne kolme preparaadi suhtes, 33 tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus, 2010. aasta

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				
Ampitsilliin				
Amoksitsilliin/Klavulaanhape				
Erütromütsiin	187			187
Tetratsükliin	100	1	26	127
Nalidiksiinhape	22		10	32
Tsiprofloksatsiin	100	1	85	186

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2010