


Kampülobakterenteriit, 2011. a

2011. aastal registreeriti 214 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 16,0). 213 haigusjuhtu on kinnitatud mikrobioloogiliselt, üks diagnoos on pandud kliinilise pildi ja bakterioloogiliselt kinnitatud juhuga epidemioloogilise seose alusel. 2010. aastal registreeriti 197 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 14,7). Võrreldes 2010. aastaga suurenes haigestumine 8,6% võrra. Hospitaliseeriti 125 patsienti (58,4% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2011. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	4	7	14	15	15	26	25	23	18	30	24	13	214

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2011. a




Isoleeritud serotüübid, 2011. aasta

	<i>Camp. jejuni</i>	<i>Camp. lari</i>	<i>Camp. coli</i>	<i>Camp. sp</i>	Kokku
Kokku	198	1	1	14	214
%	92,5	0,5	0,5	6,5	

Avastati neli rühmaviisilist haigestumist kahe juhuga (Tallinnas, Harjumaal, Pärnumaal ja Raplumaal, kõik *C. jejuni*). 19 juhul (8,9% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Austraalias üks, Hiinas üks, Indias kolm, Lätis kaks, Prantsusmaal kaks, Saksamaal üks, Tais kaks, Türgis kaks, Ukrainas üks, Venemaal kolm, Venezuelas üks).

Haigetest oli mehi 59,8%, naised – 40,2%,

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2011. a



Andmed on 198 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe kuni seitsme antimikroobse preparaadi suhtes. 16 juhul määrati tundlikkus 7 preparaadi suhtes, 54 juhul kuue preparaadi suhtes, ühel juhul viie preparaadi suhtes, ühel juhul nelja preparaadi suhtes, 105 juhul kolme, 22 juhul kahe ning 8 juhul – ühe preparaadi suhtes.

Kolm tekitajat olid resistentsed nelja preparaadi suhtes, 11 – kolme preparaadi suhtes, 49 – kahe preparaadi suhtes.

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2011 (100 000 el. kohta)

