

Kampülobakterenteriit, 2012. a


2012. aastal registreeriti 268 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 20,0). Kõik haigusjuhud on kinnitatud mikrobioloogiliselt, sh 18 antigeeni määramisega. 2011. aastal registreeriti 214 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 16,0). Võrreldes 2011. aastaga suurenes haigestumine 25,2% võrra.

Hospitaliseeriti 144 patsienti (53,7% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2012. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	11	9	7	6	18	14	26	57	44	38	20	18	268

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2012. a



Isoleeritud serotüübid, 2012. aasta

Serotüüp	<i>C. jejuni</i>	<i>C. coli</i>	<i>C. fetus</i>	<i>C. lari</i>	<i>C. sp</i>	Kokku
Kokku	235	1	1	1	30	268
%	87,6	0,4	0,4	0,4	11,2	


Esines 9 rühmaviisilist haigestumist: 8 kahe juhuga (Pärnumaal üks *C. spp*, Harjumaal kolm *C. jejuni* ja Tallinnas neli *C. jejuni*) ning üks kolme juhuga (Harjumaal, *C. jejuni*).

15 juhul (5,6% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Suurbritannias kolm, Indias kolm, Bulgaarias üks, Indoneesias üks, Itaalias üks, Kreekas üks, Leedus üks, Prantsusmaal üks, Tais üks, Türgis üks ja Ukrainas üks).

Seost toiduga võib oletada 41 juhul (sh kanaliha 15 juhul, munad või toormune sisaldav toit viiel juhul, hakkliha/muu liha viiel juhul, puuviljad kahel juhul, pastöriseerimata piim 9 juhul ja muu toit neljal juhul).

Haigetest oli mehi 53,4%, naisi – 46,6%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2012. a



On andmed 246 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe-seitsme antimikroobse preparaadi suhtes. 95 juhul määrati tundlikkus 6-7 preparaadi suhtes, 125 juhul kolme-nelja preparaadi suhtes ning 26 juhul – ühe-kahe preparaadi suhtes. 55 tekitajat olid resistentsed kahe, 32 – kolme, neli – nelja ning üks – kuue preparaadi suhtes.

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2012 (100 000 el. kohta)

