

Kampülobakterenteriit Eestis 2013. aastal


2013. aastal registreeriti 385 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 28,7). 99,2% haigusjuhtudest on kinnitatud mikrobioloogiliselt, kolmel juhul põhines diagnoos kliinisel pildil ja epidemioloogilisel seosel laboratoorselt tõestatud juhtudega. 2012. aastal registreeriti 268 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 20,0). Võrreldes 2012. aastaga suurenes haigestumine 43,6% võrra.

Haigestunute hospitaliseeriti 222 patsienti (57,7% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Registreeritud haigete arv kuude kaupa, 2013. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	20	18	13	33	38	40	48	34	68	36	11	26	385

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2013. aasta



Isoleeritud serotüübid, 2013. aasta

	<i>C. jejuni</i>	<i>C. coli</i>	<i>C. fetus</i>	<i>C. sp</i>	Kokku
Kokku	315	9	1	60	385
%	81,8	2,3	0,3	15,6	


Esines 9 rühmaviisilist haigestumist: üks nelja juhuga Pärnumaal (*C. jejuni*), üks kolme juhuga Narvas (sissetoodud *C. jejuni*) ning 7 kahe juhuga (kaks Harjumaa, kolm Tallinnas, üks Ida-Virumaal ja üks Järvamaal, kõik *C. jejuni*).

18 juhul (4,7% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Bulgaarias üks, Egiptuses neli, Hispaanias üks, Indias kaks, Leedus üks, Lõuna-Aafrika Vabariigis üks, Marokos üks, Mehhikos üks, Norras kaks, Tuneesias üks, Türgis üks, Venemaal üks ja Vietnamis üks).

Seost toiduga võib oletada 45 juhul (sh kanaliha 12 juhul, munad või toormune sisaldav toit neljal juhul, toorpiim 12 juhul, muu liha 11 juhul ja muu toit kuuel juhul).

Haigetest oli mehi 49,9%, naise – 50,1%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2013. aasta



Andmed on 358 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe-seitsme antimikroobse preparaadi suhtes. 167 juhul määrati tundlikkus 6-7 preparaadi suhtes, 145 juhul kolme-nelja preparaadi suhtes ning 46 juhul – ühe-kahe preparaadi suhtes.

Edastatud andmetes oli 54 multiresistentset (kolme ja rohkem preparaadi suhtes) tekitajat: kolme preparaadi suhtes 37, nelja preparaadi suhtes 16, viie preparaadi suhtes üks.

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2013 (100 000 el. kohta)

