


Salmonelloos Eestis, 2018. a 3 kuud

2018. aasta kolme kuu jooksul registreeriti Eestis 37 salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 2,8). Kõik juhud on kinnitatud laboratoorselt (sh üks seroloogiliselt). 2017. aasta samal ajavahemikul registreeriti 16 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 1,2).

Hospitaliseeriti 28 patsienti (75,7% haigete üldarvust).

Salmonelloosi haigestumus maakonniti, 2018. a 3 kuud



Isoleeritud salmonellade serotüübid, 2018. a 3 kuud

	S. Enteritidis	S. Infantis	S. Java	S. Kottbus	S. Stanley	S. Thompson	S. Typhimurium	S. Typhimurium monofaasiline	S. B-grupp	S. E4-grupp	S. spp	Kokku
Kokku	18	2	1	1	1	1	5	2	2	1	3	37
%	48,6	5,4	2,7	2,7	2,7	2,7	13,5	5,4	5,4	2,7	8,1	

Harvaesinevad serotüübid

Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Kottbus	1	Ei ole	kanamunad	1960-1999 – 84 juhtu; 2011-2014 – 3 juhtu


Esines kolm rühmaviisilist haigestumist (kõik S. Enteritidis): kaks kodukollet kahe haigusjuhuga ning üks pagaritoodangu tarbimisega seotud puhang viie haigusjuhuga.

7 juhul oli nakatumine oletatavalt seotud reisimisega (Filipiinidel 1, Indoneesias 1, Kambodžas 1, Tais 4).

Seost toiduga võib oletada 13 juhul, sh kanaliha kahel juhul, munad või toormune sisaldav toit 10 juhul, sealihaga ühel juhul.

Haigetest oli mehi 40,5%, naisi 59,5%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2018. a 3 kuud



30 juhul uuriti salmonella kultuure Terviseameti laboris (81,1% üldarvust).

On olemas referentfunktsiooni raames uuritud 42 kultuuri tundlikkuse määramise tulemused. Edastatud andmetes oli 5 multiresistentset (3 ja rohkem preparaadi suhtes) tekitajat (4 monofaasilist *S. Typhimurium* – üks 8, üks 6 ja kaks 3 preparaadi suhtes ning üks *S. Infantis* 4 preparaadi suhtes).

Salmonellade antimikroobne tundlikkus (kõik serotüübid), 2018. a 3 kuud

Antimikroobne preparaad	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
Ampitsilliin	38		4	42
Gentamütsiin	41		1	42
Klooramfenikool	41		1	42
Kolistiin	42			42
Meropeneem	42			42
Nalidiksiinhape	35		7	42
Sulfoonamiidid	37		5	42
Tetratsükliin	38		4	42
Tigetsükliin	39			39
Trimetoprim	40		2	42
Tsefepiim	41		1	42
Tsefoksitiin	40		2	42
Tsefotaksiim	40		2	42
Tseftasidiim	40		2	42
Tsiprofloksatsiin	40		2	42

**Salmonelloosi haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2018. a 3 kuud
(100 000 el. kohta)**

