Tabel D. Vaktsineerimissoovitused rasedatele, rasedust planeerivatele naistele ja imetavatele emadele

Soovitatud vaktsineerida
Võib vaktsineerida näidustuse olemasolul
Ei ole näidustust või on vastunäidustatud

Vaktsiinid	Enne rasedust	Raseduse ajal		Imetamine	Märkused
Gripp	**Võib**	**Jah, soovitatud. Vaktsiini võib teha igal raseduse trimestril.**	Raseduse ajal soovitatud vaktsiine võib teha samal visiidil või ükskõik millise ajalise intervalliga, v.a. dTap ja RSV-vaktsiinid, mille vahel on soovitatav intervall vähemalt kaks nädalat.	**Võib**	Vaktsiin on tugevalt soovitatud enne hooaja algust (oktoober-november) raseda kaitseks gripihooajal. Vaktsineerida võib kogu gripihooaja jooksul.
COVID-19	**Võib**	**Jah, soovitatud. Vaktsiini võib teha igal raseduse trimestril.**		**Võib**	Vaktsiin on soovitatud raseda kaitseks, sest neil on suurem risk raskeks COVID-19 kuluks (sh risk lootele) võrreldes mitterasedate samaealiste naistega. Vaktsineerida võib tingimusel, kui viimasest vaktsineerimisest/ läbipõdemisest on möödunud vähemalt 6 kuud või inimene ei ole siiani vaktsineeritud ja/või läbipõdenud.
Difteeria, teetanus, läkaköha (dTap vaktsiin)	**Võib**	**Jah, soovitatud 28.–34. rasedusnädalal (võib manustada raseduse II ja III trimestril)**		**Võib**	Vaktsiin on soovitatud eelkõige imiku kaitseks läkaköha vastu esimestel elukuudel. Vaktsiin on soovitatud iga raseduse ajal, sõltumata intervallist eelmise raseduse- ja eelmise dT vaktsineerimisega.
RSV (*respiratory syncytial virus*), vaktsiin Abrysvo®	**Võib**	**Jah, soovitatud 28–34. rasedusnädalal (võib manustada 24.–36. rasedusnädala vahel)**		**Võib**	Vaktsiin on soovitatud, kui raseduse kolmas trimester jääb vahemikku august-jaanuar, eelkõige imiku kaitseks RSV vastu esimestel elukuudel. Soovitatav intervall Abrysvo ja difteeria-teetanus-läkaköha (dTap) vaktsiinide manustamise vahel on vähemalt kaks nädalat.

Hepatiit A	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Hepatiit B	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Hib (Haemophilus influenzae tüüp b)	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
HPV (*inimese papilloomiviirus*)	Võib	Ei	Võib	Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine HPV vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks.
Leetrid, mumps, punetised (MMR vaktsiin)	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul	Ei	Võib, ettevaatusega*	Rasedust planeerival naisel on soovitatav teada oma MMR vaktsineerimise staatust ning vaktsineerimata naistele soovitame vaktsineerimist vähemalt 4 nädalat enne rasestumist. Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine MMR vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks. *****_Kui lapsel on kinnitatud või kahtlustatav immuunpuudulikkus, tuleb imetamise ajal ema vaktsineerimisel hinnata riski-kasu suhet._
Pneumokokk	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Puukentsefaliit	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Poliomüeliit	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Tuulerõuged	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul	Ei	Võib, ettevaatusega*	Rasedust planeerival naisel on soovitatav teada oma tuulerõugete läbipõdemise/vaktsineerimise staatust ning läbipõdemata/vaktsineerimata naistele soovitame vaktsineerimist vähemalt 4 nädalat enne rasestumist. Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine tuulerõugete vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks. *****_Kui lapsel on kinnitatud või kahtlustatav immuunpuudulikkus, tuleb imetamise ajal ema vaktsineerimisel hinnata riski-kasu suhet._
Vöötohatis (vaktsiin Shingrix®)	Võib	Ei	Võib	Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine vaktsiiniga Shingrix ei ole näidustus raseduse katkestamiseks.

Marutõbi	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Meningokokk	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Kollapalavik	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul	Ei*	Ei*	**Raseduse ja imetamise ajal võib vaktsineerida suure nakatumise riski korral, kasu ja riskide hindamisel. Imetamise korral on soovitatav 2 nädala jooksul rinnapiim välja pumbata ja seejärel võib imetamist jätkata.*
Kõhutüüfus	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Mpox (ahvirõuged)	Võib	Ei*	Ei*	**Raseduse ja imetamise ajal võib vaktsineerida suure nakatumise riski korral, kasu ja riskide hindamisel.*
Dengue	Võib*	Ei	Ei	Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine dengue vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks. **Enne rasedust võib vaktsineerida juhul, kui on laboratoorselt kinnitatud eelnev Dengue viirusinfektsiooni läbipõdemine.*
Difteeria-teetanus (dT)	Võib	Võib	Võib	

Märkus. Ülaltoodud vaktsiinid on **tasulised,** välja arvatud järgmistel juhtudel:

- Gripi ja COVID-19 vaktsiinid on rasedatele tasuta.
- Pneumokoki ja meningokoki vaktsiinid kõrge riskiga riskirühmade patsientidele (sh riskirühma rasedatele) tasuta, vt Terviseameti koduleht
- Difteeria-teetanuse (dT) vaktsiin on kõigile täiskasvanutele (sh rasedatele) tasuta.