TERVISEAMET

Kampülobakterenteriit Eestis, 2026. a 9 kuud

2026. aasta 9 kuu jooksul registreeriti 284 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 20,7). 281 haigusjuhtu on laboratoorselt kinnitatud, neist 159 (56,6%) nukleiinhappe/antigeeni määramisega. Kolmel juhul põhineb diagnoos kliinilisel pildil ja epidemioloogilisel seosel laboratoorselt kinnitatud juhuga. Võrdlusena registreeriti 2025. aasta 9 kuu jooksul 265 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 19,3). Võrreldes 2025. aastaga suurenes haigestumine 7,2% võrra.
Haigusjuhte registreeriti kõikides maakondades välja arvatud Jõgevamaa. Suurem haigestumus 100 000 elaniku kohta oli Narvas (42,3), Raplamaal (29,4), Lääne-Virumaal (28,8) ja Pärnumaal (28,5).

Tabel 1. *Campylobacter.* Isoleeritud serotüübid, 2026. a 9 kuud

Piirkond	*C. jejuni*	*C. coli*	*C. jejuni + C. lari*	*C.* spp	*epid. seos*	Kokku	100 000 el. kohta
Tallinn	28	4		64	2	98	21,5
Harjumaa	9	2	1	26		38	19,9
Hiiumaa	1				1	2	24,0
Ida-Virumaa	15	3		1		19	25,9
Narva	18	2		4		24	42,3
Jõgevamaa						0	0,0
Järvamaa	2			3		5	16,8
Läänemaa				3		3	14,7
Lääne-Virumaa	11	4		2		17	28,8
Põlvamaa				2		2	8,5
Pärnumaa	9	1		15		25	28,5
Raplamaa	5			5		10	29,4
Saaremaa	2					2	6,3
Tartumaa	4			29		33	20,0
Valgamaa				1		1	3,6
Viljandimaa				4		4	8,9
Võrumaa				1		1	3,0
Kokku	104	16	1	160	3	284	20,7
%	36,6	5,6	0,4	56,3	1,1		


Peamiseks kampülobakterenteriidi tekitajaks oli *C. jejuni* (36,6%). 56,3% juhtudest jäi tekitaja tüpiseerimata.
23 juhul toimus oletatavalt nakatumine väljaspool Eestit (Alžeerias üks, Ameerika Ühendriikides üks, Bulgaarias üks, Egiptuses üks, Hispaanias üks, Horvaatias kaks, Indias üks, Indoneesias üks, Itaalias üks, Küprosel üks, Leedus üks, Lätis üks, Soomes üks, Tais kolm, Türgis viis, Venemaal üks).
Seost toiduga võib oletada 46 juhul, sh kanaliha 20, muu liha 7, munad kahel ja muu toit kolmel juhul. Kuuel juhul toimus oletatavalt nakatumine kokkupuutel looma/linnuga.

Tabel 2. Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine soo ja vanuse järgi, 2026. a 9 kuud

Sugu	Vanusrühmad											Kokku	%
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-	Teadmata		
M	7	28	27	17	26	11	7	6	5	14		148	52,1
N	5	29	16	22	15	13	11	4	1	20		136	47,9
Kokku	12	57	43	39	41	24	18	10	6	34	0	284	
%	4,2	20,1	15,1	13,7	14,4	8,5	6,3	3,5	2,1	12,0	0,0		

Mehi oli 52,1%, naisi 47,9%. Kogu haigestunutest 53,2% olid lapsed vanuses 0-14 a, 14,4% olid noorukid vanuses 15-19 a, 20,4% isikud vanuses 20-59 a ning 12,0% haigestunutest olid isikud vanuses üle 60 aastat. Hospitaliseeriti 165 patsienti (58,1% haigete üldarvust).
Esines kaks rühmaviisilist haigestumist kolme haigusjuhuga.

Joonis 1. Haigusjuhtude registreerimine kuude kaupa, 2025-2026



On olemas referentfunktsiooni raames uuritud 248 kultuuri tundlikkuse määramise tulemused. Edastatud andmetes on viis multiresistentset *C. coli* (kolme preparaadi suhtes).

Tabel 3. *Campylobacter*. Antimikroobne tundlikkus, 2026. a 9 kuud

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
Ertapeneem	19	185	204
Erütromütsiin	243	5	248
Gentamütsiin	247	1	248
Klooramfenikool	248		248
Tetratsükliin	59	189	248
Tsiprofloksatsiin	26	222	248

89,5% tüvedest on resistentsed tsiprofloksatsiini ja 76,2% tetratsükliini suhtes. 9,3% tüvedest on tundlikud kõikide preparaatide suhtes.

Koostaja: J. Epštein. Nakkushaiguste epidemioloogia osakond